

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada: 3 A

Číslo: VY_32_INOVACE_IKT_1ROC_11

Obrázky




Předmět:	Informační a komunikační technologie
Ročník:	1.
Klíčová slova:	Word 2010, obrázky
Anotace:	Vkládání obrázků do textu
Jméno autora:	Ing. Miroslav Kunetka
Adresa školy:	Střední škola zemědělská, Osmek 47 750 11 Přerov

Výchozí text


Ledňáček říční je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí křídel měří 24–26 cm a dosahuje hmotnosti mezi 40–45 g. Má zavalité tělo, krátký ocas a končetiny, široká křídla a zhruba 4 cm dlouhý rovný zašpičatělý zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením, které se mírně liší v závislosti na jednotlivých poddruzích (viz Taxonomie). Středoevropský poddruh, *A. a. ispida*, má vnější část křídel, hřbet, ocas a téměř celou hlavu modrou, hrud' a končetiny jsou jasně oranžové, zobák tmavý, skvrna pod ním a po stranách krku je pak zbarvena bíle.

Obě pohlaví se přitom zbarvením nijak výrazně neliší, samice však na rozdíl od samců mají červeně zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednotvárněji zbarveni a jejich opeření má zelenavější odstín


Vložení obrázku



Výběr obrázku




Změna rozměrů pomocí myši




• • • /


Velikost obrázku pravým tlačítkem



Velikost obrázku na Kartě



Šířka změněna na 5 cm




Posunutý obrázek v řádku

Ledňáček říční je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí křídel měří 24–26 cm a dosahuje hmotnosti mezi 40–45 g. Má zavalité tělo, krátký ocas a končetiny, široká křídla a zhruba 4




cm dlouhý rovný zašpičatělý zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením, které se mírně liší v závislosti na jednotlivých poddruzích (viz Taxonomie). Středoevropský

Zalamování textu pravým tlačítkem




Zalamování textu na Kartě



stá 16–17 cm, v ro
átký ocas a končetiny, široká křídla a zhrub

Těsné obtékání obrázku

Ledňáček říční je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí křídel měří 24–26 cm a dosahuje hmotnosti mezi 40–45 g. Má zavalité tělo, krátký ocas a končetiny, široká zašpičatělý zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením, které se mírně liší v závislosti na jednotlivých poddruzích (viz Taxonomie). Středoevropský poddruh, *A. a. ispida*, má vnější část křídel, hřbet, ocas a téměř celou hlavu modrou, hrud a končetiny jsou jasně oranžové, zobák tmavý, skvrna pod ním a po stranách krku je pak zbarvena bíle.



Obě pohlaví se přitom zbarvením nijak výrazně neliší, samice však na rozdíl od samců mají červeně zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednotvárněji zbarveni a jejich opeření má zelenavější odstín

Styly obrázku



Změněný styl, obtékání oválu

Ledňáček říční je jen o 17 cm, v rozpětí křídel mezi 40–45 g. Má široká křídla a zhruba Je výrazný svým liší v závislosti na Taxonomie).

má vnější část křídel, hrud' a končetiny jsou jasné stranách krku je pak zbarvena bíle.



něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–měří 24–26 cm a dosahuje hmotnosti zavalité tělo, krátký ocas a končetiny, 4 cm dlouhý rovný zašpičatělý zobák. zářivým zbarvením, které se mírně jednotlivých poddruzích (viz Středoevropský poddruh, A. a. ispida, hřbet, ocas a téměř celou hlavu modrou, oranžové, zobák tmavý, skvrna pod ním a po

Obě pohlaví se přitom zbarvením nijak výrazně neliší, samice však na rozdíl od samců mají červeně zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednotvárněji zbarveni a jejich opeření má zelenavější odstín

Obnova obrázku

Ledňáček říční je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí křídel měří 24–26 cm a dosahuje hmotnosti mezi 40–45 g. Má zavalité tělo, krátký ocas a končetiny, široká křídla a zhruba 4 cm dlouhý rovný zašpičatělý zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením, které se mírně liší v závislosti na jednotlivých poddruzích (viz ispida, má vnější modrou, hrud' a skvrna pod ním a




část křídel, hřbet, ocas a téměř celou hlavu končetiny jsou jasně oranžové, zobák tmavý, po stranách krku je pak zbarvena bíle.


Obě pohlaví se přitom zbarvením nijak výrazně neliší, samice však na rozdíl od samců mají červeně zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednotvárněji zbarveni a jejich opeření má zelenavější odstín



Natočení obrázku



Natočení obrázku



Natočení obrázku

Ledňáček říční je jen křídél měří 24–26 tělo, krátký ocas a zašpičatělý které se poddruzích A. a. ispida, celou hlavu zobák tmavý, skvrna



o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí cm a dosahuje hmotnosti mezi 40–45 g. Má zavalité končetiny, široká křídla a zhruba 4 cm dlouhý rovný zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením, mírně liší v závislosti na jednotlivých (viz Taxonomie). Středoevropský poddruh, má vnější část křídél, hřbet, ocas a téměř modrou, hrud' a končetiny jsou jasně oranžové, pod ním a po stranách krku je pak zbarvena bíle.

Obě pohlaví se přitom zbarvením nijak výrazně neliší, samice však na rozdíl od samců mají červeně zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednotvárněji zbarveni a jejich opeření má zelenavější odstín


Formát obrázku

ční je jen
24–26
ocas a

o něco málo větší než vrabec.
cm a dosahuje hmot
končetiny, široká kří
zobák. Je výra:
mírně liší v z
(viz Taxonom
má vnější část
modrou, hrud' a
pod ním a po stran

ý, skvrna

se přitom zbarvením nijak vý
řen spodní čelisti. Mladí ptáci
odstín




Rotace v prostoru

ní je jen
4–26
ocas a


, skvrna

se přitom zba
řen spodní čel
odstín

o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí
cm a dosahuje hmotnosti mezi 40–45 g. Má zavalit
končetiny, široká křídla a zhruba 4 cm dlouhý rovn
zobák. Je výrazný svým zářivým zbarvením,
mírně liší v závislosti na jednotlivých
(viz Taxonomie). Středoevropský poddruh,
má vnější část křídel, hřbet, ocas a téměř
modrou, hrud' a končetiny jsou jasně oranžové
pod ním a po stranách krku je pak zbarvena bíle.




Odebrat pozadí



Odebrat pozadí – původní návrh

Ledňáček říční je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm a dosahuje hmotnosti mezi 10–12 g. Má zavalité tělo, krátký ocas a 7–8 cm dlouhý rovný zašpičkatý zobák. Vyznačuje se výrazným svým zářivým zbarvením na jednotlivých částech těla. Existuje několik poddruhů (viz Taxonomie). Poddruh a. ispida, má vnější části těla zelenavě modré, hřbet, ocas a hrud' a končetiny zelenavě modré, břicho a podkřídlí světle oranžové, po stranách krku bílé.



Obě pohlaví se přitom zbarvením podobají, jak výrazně neliší, samice má červeně zbarvený kořen spodní čelisti. Mladí ptáci jsou obecně jednodušší, mají zelenavější odstín.


Odebrat pozadí – po úpravě

ček říční je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16-
ahuje hmotnosti mě... Má zavalité tělo, krátký oc
ouhý rovný zašpič... zný svým zářivým zb
notlivých... ddruzích (viz Ta
da, má vnější... ýdel, hřbe
a končetiny... sně oranž
anách krku... zbarvena b



ohlaví se přitom... barvením nijak vý
i mají červeně zbarvený... kořen spodní čelisti.
eni a jejich opeření má zelenavější odstín

Potvrzení úprav



Výsledek

e hmotnosti mezi 40–45 g. má zavalité tělo, krátký rovný zašpičatělý zobák. Je výrazný svým zářivě zeleným poddruzích (část křídel, jsou jasně pak zbarven



aví se přitom i červeně zbarvený zbarvením níž kořen spodní části jejich opeření má zelenavější odstín

Použité zdroje



- Veškeré použité obrázky vznikly skenováním obrazovky MS Wordu a MS Excelu

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslav Kunetka
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.*